

NAZORG NA DE BESNIJDENIS

☎ Telefoon 035-692 9213

✉ info@besnijdeniscentrum.nl

1. Wondverzorging met vaseline

De wond en de eikel worden na de besnijdenis bedekt met vaseline zalf (vaselinum album). Dit heeft hetzelfde effect als een verband: het beschermt de wond en het voorkomt dat de eikel gaat vastplakken aan de luier of de onderbroek. Bij iedere luierwisseling brengt u de vaseline aan, de eerste 2-3 dagen veel, daarna nog 2 weken maar wat minder. Draagt hij een onderbroek dan is het goed hem een strakke onderbroek te geven die goed ondersteunt en een gaasje te gebruiken!

2. Nabloeding

Een beetje bloedverlies is normaal (klein bloedplekje in luier of onderbroek). Maar als de wond echt blijft doorbloeden (druppelen) moet u contact opnemen met de dienstdoende arts van Besnijdenis Centrum Nederland. Indien nodig dient u voor behandeling van een nabloeding met uw zoon terug te komen naar het centrum waar hij is besneden. Ga niet zomaar naar de eerste hulp van een ziekenhuis of naar een huisartsenpost !

3. Plassen

Hij moet binnen 12 uur na de besnijdenis hebben geplast. Zo niet, neem telefonisch contact op.

4. Pijnstilling

Eén uur voor de besnijdenis geeft u uw zoon een (zet)pil Paracetamol en daarna na zo nodig elke 4 uur (tot maximaal 4 per dag !) in de volgende dosering:

Leeftijd jongen:	Dosering Paracetamol:
- tot 3 maanden:	een zetpil van 60 mg
- van 3 tot 12 maanden:	een zetpil van 120 mg
- van 1 tot 6 jaar:	een zetpil van 240 mg
- 6 jaar en ouder:	een zetpil van 500 mg of een tablet van 500 mg

5. In bad of onder de douche

Vanaf de 1e dag na de besnijdenis zet u uw zoon elke dag 1 tot 3 keer 5-10 minuten in een bad met schoon handwarm water of onder de douche om de penis en de wond te reinigen. Liever geen zeep of shampoo gebruiken. Na het bad of douche weer de vaseline aanbrengen.

6. Hechtingen

De hechtingen zijn oplosbaar en vallen er na 2 tot 3 weken vanzelf uit.

7. Zwelling, blauwe verkleuring huid

De eerste dagen na de besnijdenis kan de penis wat gezwollen zijn met een blauwe verkleuring van de penis en balzak. Dit is een bloeditstorting door de prik van de verdoving. Het verdwijnt vanzelf.

8. Geel beslag op de eikel

Op de eikel (vooral aan de onderkant) kan een **geel of wit laagje** ontstaan wat er soms wat vies uit ziet en op pus kan lijken. We noemen dit 'wondbeslag' en het zijn in feite zachte korstjes die vanzelf na 1-2 weken door het baden weer verdwijnen. Dit is dus geen infectie, de eikel infecteert nooit !

9. Infectie

Als het eerst allemaal goed gaat, maar de penis na 4 -7 dagen opeens **dik, rood en pijnlijk** wordt, dan is er waarschijnlijk sprake van een wondinfectie. Zuigelingen gaan door pijn vaak slecht drinken. Als een wondinfectie optreedt kunt u contact opnemen met uw huisarts, maar u kunt hiervoor ook de dienstdoende arts van Besnijdenis Centrum Amsterdam bellen of mailen.

10. Midazolam

Als de arts midazolam rectaal of als neusspray heeft gegeven (rustgevend) dan kan hij nog 4 uur wat suf blijven. Laat hem niet lopen, geef geen kleine snoepjes (verslikken!) en blijf in de buurt.

11. Nacontrole

Als het resultaat goed is en de wond normaal geneest, dan is controle niet nodig. Als u toch een controle afspraak wilt maken, dan kunt contact opnemen door een mail te sturen of te bellen (bij voorkeur op dinsdag en vrijdag).