

Lettre d'information sur les soins après circoncision d'un garçon

Location Amsterdam/Almere ☎ Téléphone 020-6909712 ✉ amsterdam@besnijdeniscentrum.nl

Autres locations ☎ Téléphone 085-4871506 ✉ info@besnijdeniscentrum.nl

1. Vaseline

La plaie et le gland sont couverts de vaseline après la circoncision (vaselinum album – vaseline blanche). Celle-ci produit le même effet qu'un pansement : elle couvre la plaie et évite que le gland adhère au linge ou au slip. Si votre fils porte un linge, il est important d'appliquer de la vaseline chaque fois que vous le changez. Vous pouvez arrêter l'application de vaseline une semaine après l'intervention.

2. Hémorragie

Il est normal que votre fils perde un peu de sang (petite tache de sang dans le linge ou le slip). Cependant, si la plaie saigne abondamment (gouttes), vous devez contacter le médecin de garde du Besnijdenis Centrum Nederland au téléphone. Vous pouvez appeler ce numéro jour et nuit **durant les deux jours qui suivent la circoncision**. Si nécessaire, vous pouvez revenir au centre où la circoncision a été effectuée pour traiter l'hémorragie de votre fils.

3. Urine

Votre fils doit uriner dans les 12 heures qui suivent la circoncision. Si cela ne se produit pas, vous devez nous contacter au téléphone.

4. Antidouleurs

Une heure après la circoncision, vous administrerez à votre fils un suppositoire de paracétamol et ensuite, vous referez de même toutes les six heures en respectant le dosage suivant :

Poids du patient

Dosage du paracétamol

< 5 kilos :	1 suppositoire de paracétamol de 60 mg
5 - 7 kilos :	1 suppositoire de paracétamol de 120 mg
7 - 15 kilos :	1 suppositoire de paracétamol de 240 mg
15 – 30 kilos :	1 suppositoire de paracétamol (ou un comprimé) de 500 mg
> 30 kilos:	1 comprimé de paracétamol de 1000 mg

5. Le bain

Dès le lendemain de la circoncision, vous pouvez donner à votre fils un bain de 15 minutes chaque jour, avec de l'eau claire et tiède pour nettoyer le pénis et la plaie. Il est préférable de ne pas utiliser de savon ni de shampooing. Après le bain, enduisez à nouveau le gland et la plaie de vaseline.

6. Points de suture

Les points se résorbent et tombent après 2 ou 3 semaines. Une hémorragie peut survenir si les points tombent après une dizaine de jours. Cette hémorragie n'est pas grave, elle s'arrêtera spontanément.

7. Gonflement, coloration bleue de la peau

Durant les premiers jours qui suivent la circoncision, le pénis peut gonfler et présenter une coloration bleue au niveau du pénis et des bourses. Il s'agit des conséquences de l'anesthésie. Cela disparaîtra spontanément.

8. Dépôt jaune sur le gland

Une **couche jaune** peut se former sur le gland, ce qui peut parfois paraître sale. Cela peut ressembler à une petite peau. Celle-ci est due au fait que le médecin a détaché le prépuce du gland. Ce dépôt jaune disparaît spontanément en une semaine, pendant le bain.

9. Infection

On parle d'infection quand le pénis est **enflé, rouge et très douloureux** après quelques jours. Votre fils peut également avoir de la fièvre. En général, les nourrissons boivent peu à cause de la douleur. En cas d'infection, vous pouvez contacter votre médecin traitant ou téléphoner au médecin de garde du Besnijdenis Centrum Nederland **les jours ouvrables, de 8h00 à 17h00**, au téléphone.

10. Contrôle

Si le résultat est satisfaisant et que la plaie cicatrise normalement, il est inutile de procéder à un contrôle. Si vous estimez qu'il est nécessaire d'effectuer un contrôle, vous pouvez nous envoyer un e-mail. Sinon vous pouvez nous contacter par téléphone (le mardi ou le vendredi).